

SALA SITUACIONAL DE SALUD MENTAL – VIF

SE 41 del 2026


- Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC)
- Dirección Regional de Salud Ayacucho
- Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria
- Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres





Intento de suicidio

Tendencia de casos de intento de suicidio . Ayacucho, 2017– 2026*



*hasta SE 41 del 2026

Fuente: Notiweb-Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres/DIRESA Ayacucho


PROVINCIA	FEMENINO	%	MASCULINO	%
CANGALLO	4	10%	3	10%
HUAMANGA	8	20%	6	21%
HUANCA SANCOS	2	5%	1	3%
HUANTA	12	30%	8	28%
LA MAR	7	18%	7	24%
LUCANAS	5	13%	0	0%
VICTOR FAJARDO	1	3%	3	10%
VILCAS HUAMAN	1	3%	1	3%
TOTAL	40	100%	29	100%

El análisis por provincias sobre la distribución de casos según el género, se observa que la provincia de Huanta es la más afectada, concentrando el mayor número de casos tanto en mujeres (30%) como en hombres (28%). Esto indica un posible foco de atención prioritario para las intervenciones de salud pública en esa zona. En general, la cantidad de mujeres afectadas (40 casos) supera a la de hombres (29 casos), lo cual puede reflejar diferencias en la exposición, en la búsqueda de atención o en la vulnerabilidad a la enfermedad en estudio. Provincias como Lucanas muestran un caso curioso con mujeres afectadas pero sin reportes en hombres, lo que merece un análisis más detallado para identificar causas o posibles sesgos en la notificación.

*hasta SE 41 del 2026

Fuente: Notiweb-Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres/DIRESA Ayacucho

* Incluye de otras regiones




*hasta SE 41 del 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA


Características generales de casos de intento suicidio . Ayacucho 2026

Variable	Casos	Porcentaje
Sexo		
Femenino	40	58.0
Masculino	29	42.0
Grado de instrucción		
Sin instrucción	1	1.4
Inicial	0	0.0
Primaria	7	10.1
Secundaria	51	73.9
Superior	10	14.5
Curso de vida		
Niño	0	0.0
Adolescente	26	37.7
Joven	26	37.7
Adulto	16	23.2
Adulto mayor	1	1.4
Antecedente suicida		
Nunca	31	44.9
Una Vez	13	18.8
Dos veces	13	18.8
Más de dos veces	12	17.4

Principales motivos que ocasionó el intento de suicidio . Ayacucho 2026*




Principales medios utilizados para el intento de suicidio. Ayacucho 2026*



*hasta SE 41 del 2026


Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Condición actual de casos por intento de suicidio . Ayacucho 2026*



*hasta SE 41 del 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA




*hasta SE 41 del 2026

Fuente: Notiweb-Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres/DIRESA Ayacucho



Episodios depresivos

Tendencia de casos de episodio depresivo por año. Ayacucho 2026*




*hasta SE 41 del 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Variable	Casos	Porcentaje
Curso de vida		
Niño	2	0.9
Adolescente	53	23.0
Joven	60	26.1
Adulto	94	40.9
Adulto mayor	21	9.1
Grado de instrucción		
Sin instrucción	16	7.0
Primaria	32	13.9
Secundaria	120	52.2
Superior	62	27.0
Sexo		
Femenino	172	74.8
Masculino	58	25.2
Tipo de violencia		
Física	32	13.9
Negligencia	7	3.0
Psicológica	98	42.6
Sexual	1	0.4
Otros	92	40.0

Los datos evidencian que se presenta una mayor concentración de casos de violencia en personas adultas (40,9%), seguidas de jóvenes (26,1%) y adolescentes (23,0%). Esto refleja que la problemática afecta principalmente a la población en edad productiva, sin dejar de lado la vulnerabilidad de los grupos más jóvenes. En cuanto al grado de instrucción, predomina el nivel secundario (52,2%), seguido del superior (27,0%), mientras que el sexo femenino representa la mayor proporción de los casos (74,8%), lo que pone de manifiesto una importante desigualdad de género en la distribución de los casos registrados. Respecto al tipo de violencia, destaca la violencia psicológica (42,6%), seguida de la categoría «otros» (40,0%) y la violencia física (13,9%); la negligencia (3,0%) y la violencia sexual (0,4%) presentan porcentajes menores. En conjunto, los hallazgos resaltan la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana y atención integral, especialmente dirigidas a las mujeres y a las personas expuestas a violencia psicológica. Asimismo, es fundamental investigar qué situaciones comprende la categoría «otros», debido a su elevada proporción. Desde una perspectiva epidemiológica, estos resultados describen la distribución

Casos de episodio depresivo por sexo y tipo diagnóstico. Ayacucho 2026*




*hasta SE 41 del 2026


Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA

Provincias	Femenino	%	Masculino	%
CANGALLO	13	8%	7	12%
HUAMANGA	42	24%	11	19%
HUANCA SANCOS	4	2%	2	3%
HUANTA	16	9%	2	3%
LA MAR	34	20%	15	26%
LUCANAS	58	34%	16	28%
VICTOR FAJARDO	4	2%	4	7%
VILCAS HUAMAN	1	1%	1	2%
Total	172	100%	58	100%

La distribución de los casos según sexo y provincia evidencia un predominio del sexo femenino, con 172 casos (74,8%), frente a 58 casos masculinos (25,2%). En las mujeres, la mayor proporción se concentra en Lucanas (34%), Huamanga (24%) y La Mar (20%); mientras que, en los hombres, destacan Lucanas (28%), La Mar (26%) y Huamanga (19%). Estos resultados muestran que dichas provincias concentran una parte importante de los casos registrados en ambos sexos. Por otro lado, provincias como Vilcas Huamán, Huanca Sancos y Víctor Fajardo presentan menores proporciones, aunque esto no significa necesariamente que exista un menor riesgo, ya que pueden influir el tamaño poblacional y el acceso a los servicios de atención. En términos epidemiológicos, los hallazgos resaltan la importancia de fortalecer la prevención, detección y atención integral, con especial énfasis en las mujeres y en las provincias con mayor número de casos registrados. Para determinar si existen diferencias reales de riesgo entre provincias, sería necesario contar con sus respectivas poblaciones de referencia y calcular tasas




Apoyo emocional recibido de los casos de episodios depresivos . Ayacucho 2026*




*hasta SE 41 del 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA



Episodio psicótico

Tendencia de casos de episodio psicótico por año. Ayacucho 2026*



*hasta SE 41 del 2026

Fuente: Dirección de Epidemiología, Prevención y Control de Emergencias y Desastres, NOTICOVID - DIRESA